

1-1-2011

Primulaceae

Jon M. Ricketson
Missouri Botanical Garden

John J. Pipoly III
University of Florida-IFAS/Broward County Extension, jpipoly@nova.edu

Mary Merello

This research is a product of the graduate program in Oceanography at Nova Southeastern University. Find out more about the [program](#).

Follow this and additional works at: https://nsuworks.nova.edu/occ_facbooks



Part of the [Botany Commons](#)

NSUWorks Citation

Jon M. Ricketson, John J. Pipoly III, and Mary Merello. 2011. Primulaceae. , () . https://nsuworks.nova.edu/occ_facbooks/96.

This Book Chapter is brought to you for free and open access by the Department of Marine and Environmental Sciences at NSUWorks. It has been accepted for inclusion in Marine & Environmental Sciences Faculty Books and Book Chapters by an authorized administrator of NSUWorks. For more information, please contact nsuworks@nova.edu.



Heteranthera Ruiz & Pav.
2 especies

Heteranthera oblongifolia C. Mart. ex Roem. & Schult.

Hierba. Nativa. bh-T, bmh-T. Cañón y valle del Bajo Cauca. 0-500 m.
MPIO(s): Caucasia, Zaragoza.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: E. Rondón ODCM136 (HUA).
NOTA(s): determinación provisional.

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.

Hierba. Nativa. bh-MB, bh-PM, bh-T, bmh-PM, bmh-T, bp-PM. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón, cañón y valle del Bajo Cauca, Cordillera Occidental, valle del Magdalena Medio, valle selvático del Atrato y Urabá, vertiente occidental de la Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Central. 0-2000 m.
MPIO(s): Amagá, Amalfi, Anorí, Cáceres, Caldas, Cocorná, El Retiro, Frontino, Hispania, Ituango, Medellín, San Vicente, Turbo, Yarumal.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et al. 9795 (HUA).

PORTULACACEAE

Por: Á. Idárraga

1 géneros, 2 especies.

Portulaca L.
2 especies

Portulaca oleracea L.

Hierba. Nativa, cultivada. bh-PM, bh-T, bmh-T. Cañón y valle del Bajo Cauca, valle del Magdalena Medio, valle del río Porce, vertiente oriental de la Cordillera Central. 0-1000 m.
MPIO(s): Betania, Cáceres, Cocorná, Medellín.
USO(s): comestible, medicinal.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas & R. Fonnegra 7310 (HUA).
N.V.: verdolaga.

Portulaca pilosa L.

Hierba. Nativa. bh-PM, bh-T, bs-T. Cañón y valle del Bajo Cauca, valle del río Porce. 500-1000 m.
MPIO(s): Santa Fé de Antioquia, Yolombó.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas & Curso Tax. Pl. Vasculares 10937 (HUA).

POTAMOGETONACEAE

Por: Á. Idárraga

1 género, 2 especies

Haynes, R.R. & L.B. Holm-Nielsen. 2003.
Potamogetonaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 64: 1—52.

Potamogeton L.
2 especies

Potamogeton paramoanus R.R. Haynes & Holm-Niels.

Hierba. Nativa. bh-MB. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón. 2000-2500 m
MPIO(s): El Retiro, Entrerrios.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: U. Schmidt 389 (UNA).
NOTA(s): acuática.

Potamogeton pusillus L.
subsp. **pusillus**

Hierba. Nativa. bh-MB. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón. 2000-2500 m
MPIO(s): Medellín, Rionegro.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: L. Atehortúa 560 (COL, HUA).
NOTA(s): acuática.

PRIMULACEAE

Por: J.M. Ricketson & J.J. Pipoly III; M. Merello
(*Clavija*)

8 géneros, 47 especies, 8 especies endémicas.

Pipoly III, J.J. 1993. The genus *Geissanthus* (Myrsinaceae) in the Chocó floristic province. Novon 3: 463—474; Pipoly III, J.J. 1998. The genus *Cybianthus* (Myrsinaceae) in Ecuador and Peru. Sida 18: 1—160; Ricketson, J.M. & J.J. Pipoly III. 1997. Nomenclatural notes and a synopsis of Mesoamerican *Stylogyne* (Myrsinaceae). Sida 17: 591—597; Ricketson, J.M. & J.J. Pipoly III. 2003. Revision of *Ardisia* subgenus *Auriculardisia* (Myrsinaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 90: 179—317; Ståhl, B. 1986. Two new species of *Clavija* (Theophrastaceae) from NW South America. Nordic J. Bot. 6: 769—772; Ståhl, B. 1991. A revision of *Clavija* (Theophrastaceae). Opera Bot. 107: 1—78.

Ardisia Sw.

7 especies, 3 especies endémicas

Ardisia cardenasii Pipoly

Árbol. Endémica. bh-T, bmh-PM, bmh-T. Valle selvático del Atrato y Urabá, vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 1000-1500 m.
MPIO(s): Chigorodó, Frontino, Turbo, Urrao.
TIPO: Á. Cogollo et al. 3522 (HT: JAUM; IT: JAUM, MO, US).
EJEMPLAR DE REFERENCIA: Á. Cogollo et al. 4010 (JAUM, MO).
N.V.: guayabillo.

Ardisia cogolloi Pipoly

Árbol. Endémica. bmh-PM, bmh-T, bp-PM.
Vertiente occidental de la Cordillera Occidental.
500-2000 m.
MPIO(s): Frontino, Urao.
TIPO: Á. Cogollo et al. 3498 (HT: JAUM; IT:
COL, FMB, HUA, MO).
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al.
18000 (FTG, JAUM, MO).

Ardisia dodgei Standl.

Arbusto, subarbusto. Nativa. bmh-T. Valle
selvático del Atrato y Urabá. 0-500 m.
MPIO(s): Mutatá.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: F. López & M.
Sánchez 28 (COL, MEDEL, US).

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez

Icacorea guyanensis Aubl.

Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-T, bmh-T.
Cañón y valle del Bajo Cauca, valle selvático del
Atrato y Urabá, vertiente oriental de la Cordillera
Central. 0-1000 m.
MPIO(s): Anorí, Cocorná, Dabeiba, Mutatá,
Nariño, San Luis, Turbo, Valdivia.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: Á. Cogollo &
R. Borja 758 (HUA, JAUM, MO).

Ardisia mcphersonii Pipoly

Árbol. Endémica. bmh-PM. Cordillera
Occidental, vertiente occidental de la Cordillera
Occidental. 1500-2000 m.
MPIO(s): Frontino.
TIPO: G. McPherson 12954 (HT: HUA; IT: MO,
US).
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Zarucchi et
al. 7232 (HUA, MO).

Ardisia novitensis Lundell

Arbusto. Nativa. bmh-T. Vertiente occidental de
la Cordillera Occidental. 500-1000 m.
MPIO(s): Frontino.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas
6741 (HUA, MO, US).

Ardisia scoparia Mez

Árbol. Nativa. bh-T. Valle del Magdalena Medio.
0-500 m.
MPIO(s): Puerto Triunfo.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: Á. Cogollo et
al. 4268 (JAUM, MO).

Clavija Ruiz & Pav.

7 especies

Clavija biborrana Oerst.

Arbusto. Nativa. bh-T, bmh-T. Valle del
Magdalena Medio, vertiente oriental de la
Cordillera Central. 0-500 m.
MPIO(s): Puerto Triunfo, San Luis.

EJEMPLAR DE REFERENCIA: Á. Cogollo
1040 (HUA, JAUM, MO).

Clavija cauliflora Regel

Árbol. Nativa. bmh-MB. Cordillera Occidental.
2000-2500 m.
MPIO(s): Caramanta.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J. Betancur
1106 (HUA, MO).

Clavija costaricana Pittier

Árbol, arbusto. Nativa. bh-T, bmh-T, bp-PM.
Valle selvático del Atrato y Urabá, vertiente
occidental de la Cordillera Occidental, vertiente
oriental de la Cordillera Central. 0-1500 m.
MPIO(s): Mutatá, San Luis, Urao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Fonnegra et
al. 5878A (HUA, MO).

Clavija fusca B. Ståhl

Árbol. Nativa. bh-PM. Vertiente oriental de la
Cordillera Central. 1000-1500 m.
MPIO(s): Amalfi.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et
al. 8998 (HUA).

Clavija grandis Decne.

Árbol. Nativa. bmh-T. Valle del Magdalena
Medio, vertiente oriental de la Cordillera Central.
0-500 m.
MPIO(s): San Luis.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: D. Cárdenas et
al. 2713 (JAUM, MO).

Clavija lehmannii Mez

Árbol, arbusto. Nativa. bmh-PM, bmh-T.
Vertiente occidental de la Cordillera Occidental.
500-1500 m.
MPIO(s): Frontino, Ituango.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et
al. 6683 (HUA, MO).

Clavija mezii Pittier

subsp. *allenii* (Lundell) B. Ståhl

Clavija allenii Lundell

Árbol, arbusto. Nativa. bh-T, bmh-T. Cañón y
valle del Bajo Cauca, valle selvático del Atrato y
Urabá. 0-500 m.
MPIO(s): Carepa, Caucasia, Chigorodó, Necoclí,
Turbo.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: E. Rentería et
al. 4265 (JAUM, MO).

Cybianthus Mart.

14 especies, 1 especie endémica

Cybianthus cogolloi Pipoly

Árbol. Endémica. bh-PM, bh-T, bmh-T, bp-PM.
Vertiente oriental de la Cordillera Central. 500-
2000 m.
MPIO(s): Granada, San Francisco, San Luis.



TIPO: Á. Cogollo & C.C. Estrada 296 (HT: JAUM; IT: COL, HUA, MO).
EJEMPLAR DE REFERENCIA: S.E. Hoyos & J.J. Hernández 854 (JAUM, MO).

Cybianthus croatii Pipoly

Subarbusto. Nativa. bh-T. Vertiente occidental de la Cordillera Central. 500-2500 m.
MPIO(s): Caldas.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: L. Albert de Escobar 3744 (HUA, MO, US).

Cybianthus cuatrecasii Pipoly

Arbusto, Árbol. Nativa. bp-PM. Vertiente oriental de la Cordillera Central. 1000-2000 m.
MPIO(s): San Luis.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: D.C. Daly & J. Betancur 5926 (COL, HUA, MO, NY).

Cybianthus humilis (Mez) G. Agostini

Weigeltia humilis Mez
Subarbusto. Nativa. bp-PM. Cordillera Occidental. 1000-3000 m.
MPIO(s): Urrao.
TIPO: W. Kalbreyer 1534 (LT: K).
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 17186 (COL, JAUM, MO).

Cybianthus iteoides (Benth.) G. Agostini

Badula iteoides Benth.
Arbusto. Nativa. bh-MB, bmh-MB, bp-M. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón, Cordillera Occidental, vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 2000-3000 m.
MPIO(s): Medellín, Peque, San José de la Montaña, Sonsón, Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 18563 (JAUM, MO).

Cybianthus laurifolius (Mez) G. Agostini

Conomorpha laurifolia Mez
Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM, bmh-MB, bp-MB. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón, vertiente occidental de la Cordillera Central. 1000-3000 m.
MPIO(s): Campamento, Granada, Guatapé, San Luis, Santa Rosa de Osos, Urrao, Yarumal.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: D.C. Daly & J. Betancur 5925 (COL, HUA, MO, NY).

Cybianthus marginatus (Benth.) Pipoly

Grammadenia alpina Mez, *Grammadenia andicola* Cuatrec., *Grammadenia hexamera* Pittier, *Grammadenia lehmannii* Mez, *Grammadenia marginata* Benth., *Grammadenia nitida* Mez, *Grammadenia pastensis* Mez, *Grammadenia weberbaueri* Mez

Arbusto. Nativa. bmh-MB, bp-M. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón,

Cordillera Occidental. 2500-3500 m.
MPIO(s): Belmira, Medellín, Peque, Sonsón.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Zarucchi & A.E. Brant 5302 (HUA, MO, US).
NOTA(s): arbusto que crece sobre rocas.

Cybianthus montanus (Lundell) G. Agostini

Conomorpha montana Lundell
Arbusto. Nativa. bmh-PM, bp-PM. Vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 1000-1500 m.
MPIO(s): Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 17345 (JAUM, MO).
NOTA(s): determinación provisional.

Cybianthus occigranatis (Cuatrec.) G. Agostini

Conomorpha occigranatis Cuatrec.
Arbusto, subarbusto. Nativa. bmh-PM, bmh-T, bp-MB, bp-PM. Vertiente occidental de la Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Central. 500-2000 m.
MPIO(s): Frontino, Guatapé, San Luis, Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et al. 2737 (HUA, MO).

Cybianthus parvifolius Schldl.

Arbusto. Nativa. bp-PM. Vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 1500-2000 m.
MPIO(s): Frontino.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Luteyn et al. 12173 (HUA, MO, NY).
NOTA(s): determinación provisional.

Cybianthus pastensis (Mez) G. Agostini

Conomorpha pastensis Mez, *Microconomorpha pastensis* (Mez) Lundell
Árbol, arbusto. Nativa. bh-PM, bp-M, bp-PM. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón, Cordillera Occidental, vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 1500-3500 m.
MPIO(s): Frontino, Peque, Sonsón, Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 17881 (BRIT, COL, JAUM, MO).

Cybianthus poeppigii Mez

Cybianthus albiflorus (A.C. Sm.) G. Agostini, *Cybianthus gentryi* Lundell, *Weigeltia albiflora* A.C. Sm.
Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM, bmh-T, bp-MB, bp-PM. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón, cañón y valle del Bajo Cauca, vertiente oriental de la Cordillera Central. 0-3000 m.
MPIO(s): Anorí, Frontino, Guatapé, San Carlos, Sonsón, Urrao, Valdivia.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: L. Albert de Escobar et al. 5044 (HUA, MO).

Cybianthus schlimii (Hook. f.) G. Agostini

Comomyrsine schlimii Hook. f., *Correlliana schlimii*

(Hook. f.) D'Arcy, *Weigeltia schlimii* (Hook. f.) Mez, *Weigeltia schlimii* var. *intermedia* Moldenke, *Weigeltia triandra* Aspl.

Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM, bmh-MB, bmh-T, bp-PM. Cañón y valle del Bajo Cauca, Cordillera Occidental, vertiente occidental de la Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Central, vertiente oriental de la Cordillera Occidental. 0-2000 m.
MPIO(s): Anorí, Cáceres, Medellín, San Francisco, San Luis, Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Fonnegra et al. 4032 (HUA, MO).

Cybianthus venezuelanus Mez

Cybianthus brownii Gleason, *Cybianthus egensis* Mez, *Peckia purpurea* Rusby

Árbol. Nativa. bh-PM, bh-T, bmh-T, bp-PM. Valle del Magdalena Medio, valle del río Porce, valle selvático del Atrato y Urabá, vertiente occidental de la Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Central. 0-2000 m.
MPIO(s): Amalfi, Anorí, Mutatá, Nariño, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Luis, Santo Domingo, Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.J. Pipoly et al. 17287 (BRIT, F, MICH, MO, NY, TEX, US).

Geissanthus Hook. f.

8 especies, 3 especies endémicas

Geissanthus andinus Mez

Árbol. Nativa. bp-M. Cordillera Occidental. 2500-4000 m.
MPIO(s): Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: G. McPherson 13174 (HUA, MO).

Geissanthus betancurii Pipoly

Árbol. Endémica. bh-MB, bp-PM. Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Central. 1500-3000 m.
MPIO(s): Frontino, San Luis, Urrao.
TIPO: G. McPherson 13106 (HT: HUA; IT: COL, MO, US).
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J. Betancur et al. 664 (BRIT, COL, HUA, MO, US).

Geissanthus callejasii Pipoly

Árbol. Endémica. bh-MB, bmh-MB. Cordillera Occidental. 2000-3000 m.
MPIO(s): Jardín.
TIPO: R. Callejas et al. 3916 (HT: HUA; IT: MO).
NOTA(s): conocida solamente del tipo.

Geissanthus cogolloi Pipoly

Arbusto, subarbusto. Endémica. bp-PM. Vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 1000-1500 m.
MPIO(s): Urrao.

TIPO: Á. Cogollo et al. 3955 (HT: JAUM; IT: COL, FMB, MO).

EJEMPLAR DE REFERENCIA: A.H. Gentry et al. 76111A (FMB, MO).

Geissanthus francoae Pipoly

Arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM. Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Occidental. 1500-2500 m.
MPIO(s): Támesis.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Fonnegra et al. 3202 (BRIT, COL, HUA, JAUM, MO, US).

Geissanthus kalbreyeri Mez

Árbol. Nativa. bmh-MB. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón. 1500-2500 m.
MPIO(s): La Ceja del Tambo, Medellín, San Pedro de los Milagros.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: Hno. Tomás 418 (US).

Geissanthus occidentalis Cuatrec.

Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bmh-MB, bp-MB, bp-PM. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón, Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Central, vertiente oriental de la Cordillera Occidental. 1500-3000 m.
MPIO(s): Caramanta, Guatapé, Jardín, Jericó, Medellín, San Luis, Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J. Betancur et al. 960 (HUA, MO).

Geissanthus perpunctulosus (Lundell) Pipoly

Ardisia perpunctulosa Lundell
Arbusto, subarbusto. Nativa. bp-PM. Vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 0-1500 m.
MPIO(s): Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: D. Cárdenas 3209 (COL, FMB, JAUM, MO).

Hymenandra (A. DC.) Spach

1 especie, 1 especie endémica

Hymenandra callejasii (Pipoly) Pipoly & Ricketson

Ardisia callejasii Pipoly
Árbol. Endémica. bh-T, bmh-T. Valle selvático del Atrato y Urabá. 0-500 m.
MPIO(s): Mutatá.
TIPO: R. Fonnegra & E. Rentería 953 (HT: HUA; IT: COL, MEDEL, MO).
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et al. 5683 (HUA, NY).

Myrsine L.

5 especies

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.

Myrsine popayanensis Kunth, *Rapanea coriacea* (Sw.) Mez, *Samara coriacea* Sw.



Árbol, arbusto, subarbusto. Nativa. bh-PM, bmh-MB, bp-MB, bp-PM. Altiplanos de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón, Cordillera Occidental, valle del río Porce, vertiente occidental de la Cordillera Central, vertiente occidental de la Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Central. 1000-3500 m.
MPIO(s): Caldas, Campamento, Entrerriós, Fredonia, Frontino, Guarne, Guatapé, Ituango, Jericó, La Unión, Medellín, Nariño, Sonsón, Urrao, Yarumal.
USO(s): medicinal.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Zarucchi et al. 5272 (MO, US).
N.V.: espadero.

Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) Spreng.

Caballeria dependens Ruiz & Pav.
Arbusto. Nativa. bp-M. Cordillera Occidental. 3000-4000 m.
MPIO(s): Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas 7697 (HUA, MEDEL).

Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) Spreng.

Caballeria latifolia Ruiz & Pav., *Caballeria magnifolia* Pav. ex DC., *Manglilla latifolia* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult., *Myrsine caballeria* Miq., *Rapanea latifolia* (Ruiz & Pav.) Mez

Árbol, arbusto. Nativa. bp-PM. Cañón y valle del Bajo Cauca, vertiente occidental de la Cordillera Central, vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 0-2000 m.
MPIO(s): Anorí, Fredonia, Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Fonnegra & F.J. Roldán 2301 (BRIT, F, HUA, MO, US).

Myrsine pellucida (Ruiz & Pav.) Spreng.

Caballeria pellucida Ruiz & Pav., *Manglilla pellucida* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult., *Rapanea pellucida* (Ruiz & Pav.) Mez, *Rapanea perforata* Mez

Árbol, arbusto. Nativa. bh-PM, bh-T, bp-PM. Vertiente occidental de la Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Central. 500-2000 m.
MPIO(s): Frontino, San Rafael, Urrao, Vegachí.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.L. Zarucchi et al. 5821 (HUA, MO, US).

Myrsine pellucidopunctata Oerst.

Rapanea pellucidopunctata (Oerst.) Mez
Árbol. Nativa. bh-PM, bmh-PM, bp-PM. Valle del río Porce, vertiente oriental de la Cordillera Central. 500-1000 m.
MPIO(s): Nariño, San Carlos, San Francisco, Yolombó.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: D. Cárdenas et al. 2519 (JAUM, MO).

Parathesis (A. DC.) Hook. f.

3 especies

Parathesis adenanthera (Miq.) Hook. f. ex Mez

Ardisia adenanthera Miq.
Arbusto. Nativa. bmh-T. Vertiente occidental de la Cordillera Occidental. 500-1000 m.
MPIO(s): Frontino.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: A.H. Gentry et al. 75764 (MO).

Parathesis microcalyx Donn. Sm.

Arbusto. Nativa. bh-T, bp-M. Cañón y valle del Bajo Cauca, vertiente oriental de la Cordillera Central. 0-1000 m.
MPIO(s): Anorí, San Luis, Valdivia.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: R. Callejas et al. 3442 (HUA, MO, US).

Parathesis panamensis Lundell

Árbol. Nativa. bh-T, bmh-PM, bmh-T. Vertiente occidental de la Cordillera Occidental, vertiente oriental de la Cordillera Central. 500-1500 m.
MPIO(s): Cocomá, San Francisco, San Luis, Urrao.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J.G. Ramírez & D. Cárdenas 842 (JAUM, MO).

Stylogyne A. DC.

2 especies

Stylogyne hayesii Mez

Árbol, arbusto. Nativa. bh-T, bmh-T. Valle selvático del Atrato y Urabá, vertiente oriental de la Cordillera Central. 0-1000 m.
MPIO(s): San Luis, Turbo.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: D. Cárdenas et al. 2710 (JAUM, MO).

Stylogyne turbacensis (Kunth) Mez

subsp. **laevis** (Oerst.) Ricketson & Pipoly, subsp.

turbacensis

Ardisia laevis Oerst., *Ardisia turbacensis* Kunth, *Stylogyne laevis* (Oerst.) Mez, *Stylogyne reticulata* Mez, *Tinus laevis* (Oerst.) Kuntze, *Tinus turbacensis* (Kunth) Kuntze

Árbol. Nativa. bh-T, bmh-T, bp-PM. Cañón y valle del Bajo Cauca, valle selvático del Atrato y Urabá, vertiente oriental de la Cordillera Central. 0-1000 m.
MPIO(s): Anorí, Dabeiba, Puerto Berrío, San Carlos, San Luis, Tarazá, Turbo.
EJEMPLAR DE REFERENCIA: J. Brand & M. González 977 (JAUM, MO).

PROTEACEAE

Por: M. Merello

4 géneros, 11 especies, 1 especie introducida.

Edwards, K.S. & G.T. Prance. 1993. New species of *Panopsis* (Proteaceae) from South America. Kew Bull. 4: 637—662; Gutiérrez H., L.E. 1991. Revisión de las especies Colombianas del género *Panopsis*